

Redox リドックス Supreme (スプリーム) フロアブル

成分

可給態リン酸(P_2O_5)	5%
水溶性カリウム(K_2O)	4%
マンニトール	15%
ホウ素(B)	0.14%
銅(Cu)	0.3%
鉄(Fe)	0.3%
マンガン(Mn)	0.6%
モリブデン(Mo)	0.003%
亜鉛(Zn)	0.6%
フルボ酸	微量
フミン酸	微量
可溶性炭素化合物	微量
L-アミノ酸	微量

リドックスSupreme (スプリーム)について

リドックスSupreme (スプリーム) は植物活性栄養資材で、特殊な発酵過程を経て抽出された可溶性炭素化合物と植物必須元素を含んでいます。

どのように働くか？

リドックスSupreme (スプリーム) は他に類をみない炭素化合物の配合により、植物の窒素代謝を改善します。

Redoxリドックスの特徴




Illustration © Alison E. Burke/Cassio Lynn

環境ストレス対応！

この製品の主な特長

1. 窒素代謝の改善・植物に堅実で良好な反応
2. 最適なターフクオリティ
3. 夏の値上がり修復に大切なリン酸、ストレス解消に役立つカリウム、その他多くの微量要素を含有
4. 発酵性マンニトールが、硝酸態窒素を減少させ、アミノ酸合成を促進

最も効果的な使用法

葉面施肥の場合

施用量：0.5～1.0 mL/m²
散布水量：30～50 mL/m²以上
(散布間隔は7～10日)
を葉面に直接散布して下さい。

土壌施肥の場合

施用量：0.75 mL/m²
散布水量：100～200 mL/m²以上
(散布間隔は10～14日)
を土壌面に直接散布して下さい。

施肥量、散布間隔は土壌の要求量や芝種に依ります。

容器を十分に振ってからご使用下さい。



株式会社アクションコーポレーション

用語の説明

キレーション（キレート化）－ 土壌での有害な化学反応を防ぐために、2価の陽イオンと結合させる反応。

銅（Cu）－ クロロフィルの生成や呼吸、光合成に不可欠の植物栄養素。


鉄（Fe）－ 呼吸と光合成に必須の植物栄養素。

マンガン（Mn）－ クロロフィル生成に必須の植物栄養素。

ホウ素（B）－ 細胞壁の形成と生殖組織に不可欠の植物栄養素。

硝酸イオン－ アミノ酸とタンパク質を合成するためには、まず硝酸イオンを還元して、炭素、水素、酸素と結合させる必要があります。

亜鉛（Zn）－ ホルモンの生成と節間伸長に必須の植物栄養素。



取扱代理店